


Protect®

WAX BLOCK & EXTRUDED WAX BLOCK

%0.005 Bromadiolone + %0.002 Bitrex



DÜNYA DEĞİ
Sumitomo

**ÜSTÜN BİLGİSİ VE
GLOBAL DENEYİMİ İLE
YAŞAMINIZA DAHA FAZLA
SAĞLIK ve KONFOR
GETİRMEK İÇİN
SİZE ELİNİ UZATIYOR!**

WAX BLOCK & EXTRUDED WAX BLOCK

Bu özel anti-koagülan rodentisitler, genellikle kemirgenleri tek bir tüketimden sonra öldürürler. Ölüm 4-5 gün ile, 1-2 hafta içinde gerçekleşir.

Mum bloklar kanalizasyon kanallarına yerleştirilir. Sıçanların kolayca erişebilmesi için bloğa bir tel tespit edilmiştir. Blok su seviyesine ulaşmamalı, ancak su seviyesinin çok üzerinde de kalmamalıdır. Kanalizasyon menhollerinde bloklar, özel yemleme kutuları adı verilen kutuların içine yerleştirilir. Islak bodrumlarda ve barınaklarda, blok bir telle tespit edilmelidir.

PROTECT® mum blok formülasyonu, geleneksel yemlerin uygun olmadığı, özellikle nemli koşullarda etkin kemirgen kontrolüne olanak sağlar. Mum blok etkinliğini ve tadını uzun süre koruduğu gibi, insanlar tarafından tüketilmesini önleyen acı bir madde de (Bitrex) içerir.

Çekilmiş mum blok kemirgenlerin barınaklarının, kaçma ve beslenme yerlerinin yakınlıklarına, besleme kutuları içine konmalıdır. Bulaşmanın yoğunluğuna veya alanın büyüklüğüne bağlı olarak besleme kutularına fareler için 15-30 g. ve sıçanlar için 50-100g. konmalıdır. Beslenme kutularını fareler için 5 metre, sıçanlar için 10 metre aralıklarla yerleştirilir. Blok besleme kutuları içindeki sivri uca bağlanmalıdır. Ürünü her 7-10 günde bir düzenli aralıklarla kontrol etmeli ve tepsi boşsa yeni ürün konmalıdır. Kirlenmiş yemler hemen kaldırılmalı ve yerine yenileri konmalıdır.

Çekilmiş mum bloklar "besleme kutularında" kullanım amacıyla üretilmiştir. Yeni biçimi sayesinde kemirgenler kemirecek daha geniş bir yüzey bulurlar, dolayısıyla zehirli bloktan daha büyük miktarlar tüketirler. Tüketim, çiğneme işaretlerinden kolaylıkla tespit edilebilir. Formülasyonun parafin içeriği, ıslak yerlerde etkin bir kemirgen kontrolüne olanak sağlar.

TOKSİSİTESİ:

Aktif Madde Akut oral LD₅₀ : Dişi farelerde 1,12 mg/kg

ANTİDOTU:

K₁ vitamini. Parenteral olarak: 2x10 mg.lık KONAKION ampul (intravenöz) veya Oral olarak: İki adet 10 mg.lık KONAKION içilen ampul (40 mg/gün dozunu aşmayın).

Sağlık Bakanlığı etiket dozlarımız**WAX BLOCK & EXTRUDED WAX BLOCK**

FORMÜLASYON	% a/a
Bromadiolone saf	0.005
Bitrex saf	0.002
İnert maddeler	99.993
Toplam	100.000

İMALATÇI FİRMA

Babolna Bioenviromental Centre Ltd.

H-1107 Budapest, Szallas u.6., Macaristan

SATICI FİRMA

Sumitomo Corporation Dış Ticaret A.Ş.

Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No.28 K.18

34398 Maslak/İSTANBUL

Tel: 0(212) 290 25 60 (pbx)

Fax: 0(212) 290 25 75-76